

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:  
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



## LESIONS ELEMENTAIRES DES ESPACES ET MATRICE EXTRACELLULAIRES

### Généralités

Synonymes d'espace extracellulaire :selon les organes

-Interstitium

-Chorion

-Tissu conjonctif

-Stroma

-Derme

L'espace extracellulaire ou tissu conjonctif est constitué :

-De cellules(fibroblastes,macrophages)

-D'éléments de la MEC (fibres, glyco-amino-glycanes, glyco–protéines de soutien)

-De protéines à bas poids moléculaire, vitamines, eau, ions, hormones, et de glucose provenant du plasma (le liquide tissulaire, qui permet l'échange des substances, entre capillaires sanguins et cellules).

### La Matrice Extra Cellulaire =MEC ou (ECM=Extra Cellular Matrix)

-C'est un tissu protéique ubiquitaire existant chez tout être pluricellulaire.

-C'est l'ensemble des molécules extracellulaires des tissus.

-Elle constitue un réseau qui maintient les cellules dans leur forme et leurs positions respectives les unes par rapport aux autres en déterminant ainsi la forme des organes, et toute atteinte à cette intégrité serait responsable de malformations.

-La MEC composée d'un enchevêtrement et d'un fluide de macromolécules constitue l'environnement dans lequel les cellules vont croître.

- Les macromolécules matricielles très diversifiées contrôlent les fonctions cellulaires et orientent leur comportement spécifique .

-Les constituants de la matrice extracellulaire ont des domaines de liaison avec les cellules et, ces interactions cellules/ECM sont assurées par les intégrines, ce qui permet:

1/La mobilité des cellules,

2/ leurs adhérences

3/leur régulation.

- A savoir: L'espace matriciel est le siège de:

-Progression des processus pathologiques: inflammatoire, tumoral et dysmétabolique.

-De dépôts de substances diverses (pigments, amylose...)

-De surcharges (eau= myxœdème)

Mais ces lésions appartiennent à des processus lésionnels particuliers, et ne représentent pas des lésions élémentaires de la MEC

### Fonctions tissulaires régulées par les constituants de l'ECM

a/ La migration cellulaire par le pouvoir chimiotactique et la formation de surface d'adhésion

b/La prolifération cellulaire, par la présence de GF et de macromolécules adhérant aux intégrines

c/La morphogénèse tissulaire avec acquisition de la configuration de l'organe

#### d/ Le métabolisme tissulaire

e/ La modulation du phénotype tissulaire, soit la différenciation. L'hydratation des tissus mous par le contrôle d'absorption d'eau et d'électrolytes

f/ L'absorption des sels minéraux. (Calcium pour la trame osseuse).

g/ Participation au processus inflammatoire et à la cicatrisation.

h/ Développement de l'angiogénèse

#### -Siège topographique de l'ECM dans les tissus:

-La MEC est en grande partie produite localement

-n'intéresse pas uniquement les tissus solides :certains de ses constituants non fibrillaires sont retrouvés dans le sang.

-Elle est donc présente dans tous les tissus de l'organisme avec une abondance variable, très grêle entre les cellules épithéliales mais en quantité importante dans les tissus conjonctifs lâches.

- Elle s'intercale d'une part entre les cellules tissulaires spécialisées, pour constituer la trame conjonctive ou squelettique, d'autre part elle forme une lame limitant les épithéliums de revêtement et les endothéliums vasculaires dite membrane basale, lame basale ou vitrées (lamina lucida).

#### La membrane basale

-C'est une mince couche qui sépare les cellules qui la produisent de la matrice conjonctive sous jacente. Ces membranes se reconstituent continuellement à rythme lent. Elles contiennent un collagène non fibrillaire très particulier de type IV.

-Quelques composants des membranes basales provenant de l'ECM :

-Le collagène amorphe de type IV      -La laminine en proportions importantes      -Les protéoglycannes

#### Morphologie:

-En microscopie optique: la coloration histochimique de PAS qui les fait apparaitre rouges et la coloration argentique qui leur confère une teinte brune.

La microscopie électronique révèle leur structure bilaminaire

#### Les composants de la MEC:

##### 1/composants fibrillaires:

a/ collagène et réticuline      b/ élastine

À savoir: le collagène n'est pas forcément fibrillaire ( collagène IV)

2/Glycoprotéines d'adhésion responsables du contact et la communication intercellulaires avec la matrice extracellulaire :

a/ laminine      b/ fibronectine      c/ Les thrombospondines.

d/autres

### 3/Protéoglycanes (gel)

a/ **Acide hyaluronique** et Autres

#### Les collagènes

I/Les collagènes représentent les protéines les plus abondantes du règne animal. Ils sont essentiellement constitués de molécules dont **le rôle est de résister à l'étirement**. Il existe plusieurs types de collagènes avec des structures et des rôles différents, par exemple :

**le type VII** permet **d'adhésion des membranes basales des épithéliums épidermoïdes** au **tissu conjonctif sous jacent** soit de derme superficiel,

et le **type IV** est **amorphe non fibrillaire**.

- Les différents types de collagènes sont désignés par numéros dans l'ordre de leurs découvertes et indépendamment de leurs propriétés fonctionnelles

#### Les facteurs communs aux différents types de collagènes sont :

a/ **Leur structure segmentaire hélicoïdale**

b/ **Leur unité fondamentale** représentée par **une chaîne polypeptidique** dite  **$\alpha$** .

c/ **Leur richesse** en **glycine** et en **proline**

d/ **L'assemblage de ses molécules** par **des liaisons hydrogène** (c'est l'hydroxylation).

#### Morphologie des fibres

-**Les fibrilles de collagène** se regroupent en **fibres** puis en **faisceaux safranophyles** à la **coloration HES**; ils sont bien mis en évidence par **la coloration au trichrome** qui leur donne une teinte **bleue** ou **verte**.

-La réticuline représente **un type de collagène fibrillaire** argentophile

(*coloré en brun par l'argent*) **ne constituant pas de faisceaux**.

**II/ L'élastine** : c'est une **protéine hydrophobe** élaborée par les **fibroblastes embryonnaires** et **juvéniles**.

L'élastine **s'enroule** d'une **microfibrille** pour former **la fibre élastique**.

- **A l'examen histologique** les **fibres élastiques** apparaissent **ondulées**, **auto-fluorescentes** et **mêlées aux fibres de collagène** dont elles limitent l'étirement. Elles se reconnaissent à leur apparence **brune** à la coloration par **l'orcéine**.

#### III/Les glycoprotéines de liaison et les protéines de liaison

-Elles sont variées et ubiquitaires.

-Elles interviennent dans le développement embryonnaire et **les processus fibrogéniques cicatriciels**.

-Elles peuvent être **fibrillaires** comme **la fibronectine**.

-Certaines entrent dans la constitution **des membranes basales** (**la laminine**).


-Elles relient **les membranes basales** à des **récepteurs spécifiques** de surface cellulaire : **les intégrines**.

-**Les protéines structurelles**: La **fibronectine**, et la **laminine** sont les **mieux connues**



A savoir: D'autres **protéines de liaison non structurales** assurent aussi les **interrelations entre la matrice**, les **cellules** et les **facteurs de croissance**.

Ce sont les **protéines matricellulaires**, ou **protéines adaptatrices** dont nous citons la **thromboplastine** et la **ténascine** qui interviennent beaucoup au niveau des tissus inflammatoires.



#### IV/ Les glycoaminoglycanes

- Ils constituent le **"gel"** de ECM
- Ils **protègent les tissus** contre les **pressions extérieures**
- Ils permettent la **mobilité cellulaire**, par exemple: l'**acide hyaluronique** inhibe l'**adhésion intercellulaire** et permet la **mobilité** des cellules dans l'**inflammation** et au cours de l'**embryogénèse**.

#### PATHOLOGIE DE L'ESPACE EXTRACELLULAIRE

- Toute atteinte structurale, quantitative, ou modification biomoléculaire d'un composant de l'ECM va mener à une pathologie distincte et en rapport avec le rôle du composant.
- Les **altérations primitives** de l'ECM sont **héréditaires** pour la plupart et dues à des **mutations de gènes**
- Les **lésions les plus fréquentes** concernent l'**amplification de cet espace** et l'**excès du constituant fibrillaire** de l'ECM que l'on nomme **fibrose** ou **sclérose**.
- La raréfaction du composant fibrillaire peut avoir des conséquences en rapport avec leurs diverses fonctions. Elle peut intéresser plusieurs tissus et représente des symptomatologies très variées surtout en maladies rhumatismales


##### **PATHOLOGIES SECONDAIRES AUX CARENCES EN COLLAGENE**

- \* **anévrismes ; varices ; déchirure ou rupture des tissus conjonctifs ; ulcérations ; hernies ; prolapsus**
- \* **Fragilisation et inflammation des ligaments tendons et cartilages**
- \* **instabilité des articulations avec douleurs**
- \* **désintégration du cartilage et déformation articulaire**
- \* **amincissement de la peau ; mauvaise cicatrisation**
- \* **pathologie oculaire et dentaire**
- \* **pathologies associées aux maladies auto-immunes( Lupus érythémateux et rhumatisme articulaire)**

## Pathologie des surcharge en fibres

### La fibrose

- la fibrose est l'augmentation d'un ou plusieurs des constituants fibrillaires de l'espace extracellulaire, nous en distinguons trois types



- La fibrose collagène est la lésion la plus couramment rencontrée en pathologie.

Elle est très répandue et accompagne des processus pathologiques variés.

- Les fibroses collagènes sont d'étiologies inflammatoire ou dystrophique, quelquefois tumorale:

- Les fibroses inflammatoires participent à la cicatrisation et caractérisent toutes les inflammations chroniques.

- Les fibroses dystrophiques répondent à des troubles métaboliques: Les étapes biochimiques sont nombreuses dans le contrôle de la biosynthèse du collagène et tout défaut moléculaire sera responsable de lésion fibreuse d'apparence primitive (idiopathique) ce sont:

a/ Les altérations enzymatiques et génétiques avec l'exemple des myopathies congénitales et celui de la chéloïde (fibrose dermique) qui apparaît chez certains sujets, surtout de race noire.

b/ Les effets iatrogènes comme dans l'hypertrophie gingivale due à une hydantoïne.

c/ Les troubles circulatoires avec hypoxie chronique.

. Le vieillissement qui associe fréquemment fibrose et atrophie tissulaire.

- Les fibroses tumorales occupent le stroma fibreux et abondent de certaines tumeurs dites squirrhes.

### évolution des fibroses

L'évolution des fibroses est pratiquement irréversible. Une fibrose ancienne ne peut se résorber car c'est un tissu pauvre:

1/en vaisseaux

2/en cellules, essentiellement en cellules qui sécrètent les MMP (Matrix Metallo-Proteinase).

Cependant les fines travées fibreuses de l'hépatite virale se résorbent en grande partie après guérison et le foie est alors réparé

- Dans un même organe ou tissu une fibrose peut être hypertrophique ou atrophique (occupe un volume supérieur ou inférieur à celui du tissu normal), pour cela un foie cirrhotique (la cirrhose est la fibrose du foie) peut tout aussi bien être augmenté que diminué de volume. Aussi, au niveau du derme une cicatrice peut être exubérante de type chéloïde ou linéaire fine voir punctiforme.

- Elles peuvent avoir un retentissement fonctionnel et structural.

- Les fibroses étendues sont toujours néfastes car elles induisent des insuffisances fonctionnelles du tissu qu'elles atteignent

## Topographie et conséquences des fibroses :

- Les **fibroses de pénétration** ou **fibrose mutilantes** comblent les zones de **tissu détruit au cours de l'inflammation** mais **ne restaurent pas la fonction de l'organe**.
- Par ailleurs, au cours de leur évolution **les fibroses** compriment **les cellules parenchymateuses** et **les atrophie sévèrement** jusqu'à leur **disparition**.
- Elles peuvent provoquer des **sténoses** lorsqu'elles se développent dans un **organe tubulaire** comme au niveau de **l'œsophage après ingestion de produit caustique** ou de **l'intestin grêle dans la maladie de Crohn** (maladie inflammatoire).
- dans les organes creux et entre **les feuillets viscéraux la fibrine inflammatoire** se transforme en **fibrose** et constitue des **brides** appelées **synéchies** ou **brides**. **Les synéchies utérines** sont **nocives** pour **le mécanisme de reproduction**.
- les fibroses d'encerclement** délimitent un **territoire tissulaire altéré**. Lorsqu'elles deviennent anciennes, **sclérosées** (dures) et parfois même **calcifiées** on les appelle **coques fibreuses** enveloppant essentiellement **les formations kystiques** (le contenu est de consistance molle ou liquide).
- au niveau des vaisseaux les fibroses épaississent la paroi provoquant d'une part leur fragilisation avec hypertension et d'autre part un risque d'ischémie par diminution du flux sanguin et risque d'hémorragie par rupture et manque d'élasticité. De plus des dilatations anévrismales peuvent se voir en amont des foyers de fibrose.
- **Les fibroses systématisées** accentuent la **charpente conjonctive normale** d'un tissu; elles occupent **l'espace interstitiel** comme dans **les septas interalvéolaires** où elles conduisent à **une insuffisance respiratoire**.
- La fibrose disséquante** est surtout examinée au niveau **du foie** lorsqu'elle forme **des travées reliant les espaces portes**.
- **La fibrose contractile** se constitue avec **plissement d'une cicatrice cutanée** ou une **rétraction des aponévroses**. Une fibrose au niveau des **plis du genou** ou celui **du coude** va **limiter leur extension**.

**Les fibroses** s'accompagnent souvent **d'une régénération épithéliale** qui tend à **réparer les pertes cellulaires**: ainsi la cirrhose associe une fibrose et des nodules de régénération hépatocytaires.

**Les fibromatoses** sont des lésions **d'origine génétique** ou **imprécise** fort **productrices de collagène**.

## Les mécanismes des fibroses:

- Les mécanismes fibrogéniques font intervenir:

a/ des **cellules spécialisées**

b/ des **biomolécules**.

-**Le myofibroblaste** est la principale **cellule productrice de collagène**, elle provient des **fibrocytes**, et de **cellules épithéliales** ou **endothéliales** par un **processus de transition épithélio-mésenchymateuse** ou **endothélio-mésenchymateuse**.

- Dans le foie le **myofibroblaste** provient de **la cellule étoilée**.

-**Les cellules de l'inflammation chronique**, **lymphocyte Th2** et **polynucléaire éosinophile**, sont des sources pour **les cytokines profibrotiques** qui interviennent dans **le mécanisme fibrogénique**.



-Certaines **bactéries**, tel que **l'agent de la syphilis**, et **virus**, comme celui de **l'hépatite B** provoquent le phénomène **fibrogénique**.

- Dans la plupart des maladies fibrogéniques **un remaniement vasculaire** précède la **fibrose**. Les néovaisseaux apparaissent au début et disparaissent progressivement au cours du processus. En fait **la fibrose est associée à la perte des vaisseaux sanguins dans un territoire tissulaire**.

-Le **turnover du collagène** est lent et régulé par **des médiateurs à rôles antagonistes**

soit :d'une part les **MMP** (matrix metallo-proteinase) qui sont **des enzymes de dégradation des composés matriciels**

b/d'autre part leurs **antagonistes profibrogéniques**.

**Un déséquilibre de la régulation du remodelage de l'ECM** favorise **la synthèse du collagène** et **l'installation de la fibrose**.

### Pathologies matricielles autre que la fibrose collagène

-En dehors des lésions fibro-scléreuses, et plus rarement, le collagène peut manifester des **altérations structurales** et **biochimiques** responsables d'une ou plusieurs des perturbations de ses rôles spécifiques; ces affections peuvent être **acquises** comme **le scorbut** et le **vieillissement** ou plus souvent **innées par mutation de gènes** codant pour l'un des types de collagènes.

-Le **scorbut** est une maladie **des membranes basales vasculaires** qui provient **d'une carence en acide ascorbique**, soit la vitamine C. Cet acide est nécessaire à l'hydroxylation de la proline et de la lysine pour constituer l'hydroxyproline et l'hydroxylysine.

-Aussi **une mutation du gène** qui code la molécule du **collagène de type I** va désorganiser **la structure de la triple hélice** et conduire à:

a/**une perte de la résistance aux tensions** avec **fractures osseuses**

b/**une perte de l'adhésivité cellulaire** avec **amincissement de la peau et contusions faciles**.

**Les anomalies du collagène IV** et autres constituants des **membranes basales** sont responsables de graves maladies au niveau

a/ **du rein avec altération de la filtration**

b/ **de la peau avec formations de bulles** comme la pemphingoïde bulleuse et l'épidermolyse bulleuse.

c/ **atteinte de divers organes** (voir tableau suivant :Quelques exemples de maladies héréditaires).

- **Avec l'âge**, la **biosynthèse du collagène** subit des conversions, celui-ci augmente alors sa résistance:

a/ **à l'étirement**

b/ **à la dégradation enzymatique**



## Quelques exemples de maladies héréditaires du collagène par mutation de gènes

TYPE de COLLAGENE	MALADIE HEREDITAIRE	ROLE
Col I	Ostéogénèse imparfaite constitue les os, tendons	le plus abondant
Col II	Collagénopathies type II cartilage	50% des protéines du
Col III	Sd. d'Ehler-danos type vasculaire	renforce les parois des viscères, intestins ; cœur et artères ; utérus.
COL IV	Sd d'Alport Néphropathies à membrane basale fine	Membrane basales des épithéliums
Col VI	Myopathies ( d'Ullrich , de Bethlem)	
Col VII	Epidermolyse bulleuse dystrophique	
Col IX, X, XI	Dysplasies ostéo-articulaires. (plusieurs syndromes)	
Col XVII	Epidermolyse bulleuse jonctionnelle	

### La pathologie des fibres élastiques peut être soit :

- due à une **cause génétique**, innée, et la plus connue est **la mutation de la fibrilline causant le syndrome de Marfan** dont les manifestations diverses incluent l'anévrisme disséquant de l'aorte,
- en relation **avec le vieillissement** ou des **lésions photo-induites** par l'exposition exagérée au soleil.
- Les **lésions des fibres élastiques** sécrétées par les **fibroblastes dans la peau et le poumon ne se réparent pas**
- alors que celles **des vaisseaux** sécrétées par les **myocytes se réparent assez rapidement**.

L'atteinte des fibres élastiques est responsable de lésions diverses dont les rides, les anévrismes, les relâchements de sphincters (avec incontinence), les prolapsus, les vergetures et anéodermies .

### Pathologie des molécules d'adhérence :

- Les modifications pathologiques concernant les composants non fibrillaires de l'ECM ne s'expriment pas par des **images histologiques directes**, comme les fibroses, elles s'expriment plutôt par **les conséquences de la défaillance moléculaire**.
- Les altérations de la laminine pourraient constituer un exemple : **La laminine α2 est indispensable pour l'activation du signal de croissance cellulaire via les intégrines**.

Elle participe ainsi à :

- a/ **la constitution de lame basale structurée indispensable à l'intégrité musculaire** et une mutation dans cette sous unité engendre **la mort progressive de ces fibres** suite à **des troubles métaboliques sévères**.
- b/ **La constitution des gaines de myéline des nerfs périphériques**.
- c/ **L'adhérence derme/épiderme**.

Nous comprenons donc que **toute défaillance ou absence de laminine α2** est **responsable de dystrophie musculaire congénitale**, de **neuropathie périphérique** avec perte de la stimulation musculaire et de la **formation de lésions bulleuses cutanéomuqueuses**.

### Turn over et dégradation des constituants matriciels

- Les composants de l'ECM sont essentiellement dégradés par des **enzymes à activité Zinc dépendante, Matriciel Métalo-Protéinases**.